

**BỘ Y TẾ**

Số: 790 /BYT-BMTE

V/v thay thế Nifedipin 10mg  
(viên nang phóng thích chậm)  
trong Cơ sở thuốc cấp cứu các  
tai biến sản khoa

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc trung ương

Ngày 28/12/2010, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5231/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí cấp cứu tai biến sản khoa” trong đó có Cơ sở thuốc cấp cứu các tai biến sản khoa ở trạm y tế xã, nhà hộ sinh, phòng khám đa khoa khu vực và tương đương. Theo phản ánh của một số địa phương, tại mục III. *Thuốc hạ huyết áp, chống co thắt* trong cơ sở thuốc cấp cứu chỉ có Nifedipin 10mg (viên nang phóng thích chậm) nhưng hiện nay trên thị trường không có Nifedipin 10mg dạng viên nang phóng thích chậm nêu trên. Sau khi có ý kiến chuyên môn của bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

1. Có thể thay thế Nifedipin 10mg (viên nang phóng thích chậm) trong cơ sở thuốc cấp cứu các tai biến sản khoa ở trạm y tế xã, nhà hộ sinh, phòng khám đa khoa khu vực và tương đương bằng Nifedipin 10mg không phải dạng viên nang phóng thích chậm trong các cấp cứu sản khoa.

2. Có thể thay thế Nefedipin để giảm co tử cung bằng các thuốc chống co thắt khác như:

- NoSpa 40mg x 1 ống, tiêm bắp, hoặc
- Buscopan 40mg x 1 ống, tiêm bắp, hoặc
- Papaverin 40mg x 1 ống, tiêm bắp, hoặc
- Spasmaverin 40mg x 2 viên, uống

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin gửi văn bản về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) để xem xét giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Nguyễn Việt Tiến (để BC);
- BV Phụ sản trung ương;
- TTâm CSSKSS các tỉnh/TP;
- Lưu: VT, BMTE.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Lưu Thị Hồng