

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

Số: 490/VSDTTƯ - TCQG
V/v hướng dẫn sử dụng vắc xin
có thành phần sởi để triển khai tiêm bù mũi
cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

HỎA TỐC

Kính gửi: - Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/TP


Thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2025 đợt 2 ban hành tại Quyết định số 905/BYT ngày 18/3/2025; Quyết định số 906/QQĐ-BYT ngày 18/3/2025, trong đó trẻ từ 1-5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi được tiêm bù mũi sử dụng vắc xin Chương trình tiêm chủng mở rộng theo kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tại văn bản số 59/PB-TC ngày 21/3/2025 về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin có thành phần sởi để triển khai tiêm bù mũi cho trẻ 1 đến 5 tuổi, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn sử dụng vắc xin có thành phần sởi để triển khai tiêm bù mũi cho trẻ 1 đến 5 tuổi tại Phụ lục 1 kèm theo. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị:

- Các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/TP triển khai thực hiện và chủ động phân bổ, điều phối vắc xin giữa các tỉnh/TP trong khu vực phụ trách đảm bảo sử dụng vắc xin an toàn, hiệu quả.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/TP hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin có thành phần sởi để triển khai tiêm bù mũi cho trẻ 1 đến 5 tuổi theo đúng hướng dẫn nêu trên.

Trân trọng cảm ơn. *yu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Phòng bệnh (để báo cáo);
- Sở Y tế 63 tỉnh/TP (để phối hợp);
- Viện trưởng (để báo cáo);
- Lưu HCVT, TCQG.



Dương Thị Hồng



Phụ lục 1: Hướng dẫn sử dụng vắc xin có thành phần sởi cho nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi trong chiến dịch

(ban hành kèm theo Công văn số 490/VSDTTU-TCQG ngày 21/3/2025)

TT	Đối tượng	Lịch tiêm vắc xin có thành phần sởi trong chiến dịch	Lịch tiêm vắc xin có thành phần sởi tiếp theo trong TCMR
1	Trẻ có tiền sử CHƯA tiêm hoặc chưa rõ tiền sử tiêm vắc xin có thành phần sởi		
a	Trẻ từ 12 đến dưới 18 tháng tuổi	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi-rubella khi trẻ đủ 18 tháng tuổi và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 tháng với liều vắc xin sởi trước đó
b	Trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi	Tiêm bù 01 mũi vắc xin sởi-rubella, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 tháng với liều vắc xin sởi trước đó
2	Trẻ có tiền sử ĐÃ TIÊM 01 mũi vắc xin có thành phần sởi (Không tính mũi vắc xin sởi tiêm trước 9 tháng tuổi)	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi-rubella	Không cần tiêm tiếp vắc xin sởi-rubella trong tiêm chủng thường xuyên

* Ghi chú:

- Trường hợp xác định trẻ đã mắc sởi trước đó, chỉ tiêm vắc xin Sởi-rubella cho trẻ từ 18 tháng tuổi và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 tháng với lần mắc sởi đó.
- Các trẻ có tiền sử ĐÃ TIÊM 02 mũi vắc xin sởi đơn liều (mũi 1 cho trẻ từ 9 đến 11 tháng tuổi; mũi 2 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tháng tuổi) sẽ tiêm 01 mũi vắc xin sởi-rubella khi trẻ đủ 18 tháng tuổi và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 tháng với liều tiêm vắc xin sởi trước đó.

Handwritten signature